

どうぶつクイズのヒント

Q1 カンガルーのおっぱいはふくろの中にあります。

Q2 産まれた時は、1円玉くらいの大きさしかありません。

Q3 産まれたときは、毛が生えていなく目も開いていません。



Q4 コアラは2つ、カンガルーはその倍です。

Q5 産まれた時に、親がふくろまでの道しるべをなめて教えます。それをたどって赤ちゃんはふくろまでのぼっていきます。




IUCN(国際自然保護連合)によるレッドリストのランク

LC(軽度懸念)



分布・生息地

オーストラリアのほぼ全域で、草原や半砂漠地帯、荒地に生息。



動物観察の注意点

- 音や動作などで動物を驚かせないように観察する。(気づかれないのが一番)
- 他の見学者に迷惑をかけないように観察する。
- 動物に手など出さないよう、安全に注意して観察する。
- 立ち入り禁止の場所・区域には入らないこと。
- 双眼鏡などで拡大して見ると良い。(太陽は見ないこと)
- スケッチや写真を残すと良い。(特徴をとらえたスケッチが一番)

なまえ

セルフガイド & クイズラリー



アカカンガルー

Macropus rufus

本園エリアに展示しています



アカカンガルーを知る

体

カンガルー科の中では最大種。

オスは体長 130～160cm、体重 22～85kg、尾長 85～110cm。メスは体長 80～110cm、体重 17～35kg、尾長 65～80cm。オスのほうがメスより大きい。オスの胴体は赤褐色や黄褐色、メスは青みがかった灰色になる。

オスは興奮すると、胸部からの分泌液が出るため、体毛が赤くなる。

習性

10～12頭が群れをなして生活する。そのうち2、3頭が大人のオスで、残りがメスと子どもである。多い時には100頭ほどの群れになる。移動は太い大きな尾を使い、5本足のように歩いたり、尾でバランスを取ってジャンプしたりする。比較的小となしい性質だが、オス同士で闘争するときは、尾を使って立ち上がり、前足で引っかいたり後足でけったりすることがある。

食べ物 草食性。

飼育下：草食獣用ペレット、乾草、食パン、リンゴ、ニンジンなど

野生下：草、若葉、木の芽など

繁殖

妊娠期間は30日ぐらいと短く、1cmほどの幼体で生まれて自力で母親のふくろ（育児のう）に移動して、乳首に吸いつく。ここから8か月ほど育児のうの中で成育する。動物園では、子どもが育児のうから出て、初めて全身を現した日を誕生日にしている。

動物名の語源

学名の“rufus”は「赤い」の意味。

かんさつノート

東山動植物園の動物に注目してみよう！

(※看板やボードで個体の紹介をしていることもあるよ)

- 体の色は？
- 体の特徴は？
- 何をしていることが多い？

全体をスケッチしてみよう！



気づいたことを書いてね！

観察日： 年 月 日

どうぶつクイズ

Q1 カンガルーのおっぱいはどこにあるでしょうか？

- ① わきの下
- ② ふくろ（育児のう）の中
- ③ ふくろ（育児のう）の外

Q2 カンガルーの赤ちゃんが生まれた時の大きさは？

- ① 1円玉くらいの大きさ
- ② ソフトボールくらいの大きさ
- ③ ドッジボールくらいの大きさ

Q3 カンガルーの赤ちゃんが生まれた時、毛は生えているでしょうか？

- ① まっ白な毛が生えている
- ② まったく生えていなく、赤はだか
- ③ 赤い毛が生えている

Q4 カンガルーのおっぱいの数は？

- ① 2
- ② 4
- ③ 6

Q5 産まれた赤ちゃんは、どうやってふくろの中に入るのでしょうか？

- ① 親がくわえて中にいれる
- ② さいしょからふくろの中で産まれる
- ③ 自分でふくろまでよじのぼって入る

A1	A2	A3	A4	A5
----	----	----	----	----