

どうぶつクイズのヒント

Q1 アビシニアコロブスは、顔・尻・尾・肩から腰にかけて白い毛が生え、それ以外は黒い毛です。肩から腰にかけての毛と尻尾の白い毛は長く伸び、足をついた状態では地面に届くほどです。

Q2 リーフイーターであるアビシニアコロブスは、反すう獣のように複数（3室）に分化した胃袋を持っていて、胃の中の細菌でセルロースを分解できるため、樹木の葉を主に食べます。



Q3 アビシニアコロブスの手には親指がありません。痕跡程度に退化しています。



Q4 ほお袋はありません。オナガザルにはほお袋があります。

Q5 美しい毛皮が、衣類や装飾品、土産用敷物などの材料として乱獲され、生息数が激減しています。現在は捕獲が禁止されています。


IUCN(国際自然保護連合)によるレッドリストのランク

LC(軽度懸念)



分布・生息地

アフリカ中部から東部にかけての熱帯雨林に生息。



動物観察の注意点

- 音や動作などで動物を驚かせないように観察する。(気づかれたいのが一番)
- 他の見学者に迷惑をかけないように観察する。
- 動物に手など出さないよう、安全に注意して観察する。
- 立ち入り禁止の場所・区域には入らないこと。
- 双眼鏡などで拡大して見ると良い。(太陽は見ないこと)
- スケッチや写真を残すと良い。(特徴をとらえたスケッチが一番)

なまえ

セルフガイド & クイズラリー



アビシニアコロブス

Colobus guereza

北園エリアに展示しています



東山動植物園
Higashiyama
ZOO & BOTANICAL
GARDENS

アビシニアコロブスを知る

体

体長 50～70cm、尾は 60～80cm。
体重はオス 12～15kg、メス 10kg くらい。
肩から腰にかけて白いケープのようにふさふさした毛が美しく、尾は半分またはほとんど全部が白く、太いふさのようになっている。この尾は枝から枝へ飛び移る際のパラシュートの役割を果たす。

習性

普通 1～2 頭のオスを中心に、10 頭前後の群れを作って生活する。森林の樹上にすむが、草原地では地上を移動することもある。

リーフイーター（Leaf Eater：葉を食べるの意味）と呼ばれるサル類に属している。他のサルは人間と同じように雑食に適応した胃のつくりをしているが、アビシニアコロブスの胃は、葉のセルロースを分解するために、ウシなどのように複数に分化したつくりになっていて、発酵のためのバクテリアを含んでいる。

食べ物

草食性。野生下では草、木の葉、果物など。

繁殖

妊娠期間は約 5 か月。現地でも動物園でもほぼ一年中見られる。親の毛色は白黒だが、産まれたばかりの赤ちゃんはまっ白で、その後 3 か月程度でだんだん親と同じような毛色にかわる。

動物名の語源

学名の "guereza" はこの動物の仲間に共通する、手の親指が欠けている、もしくは痕跡程度しかない特徴から、ギリシャ語の「切断されたもの」の意味を持つ言葉に由来する。

かんさつノート

東山動植物園の動物に注目してみよう！

(※看板やボードで個体の紹介をしていることもあるよ)

- ・体の色は？
- ・体の特徴は？
- ・何をしていることが多い？

全体をスケッチしてみよう！



気づいたことを書いてね！

観察日： 年 月 日

ど う ぶ つ ク イ ズ

Q1 アビシニアコロブスの毛の色は何色？

- ① 黒
- ② 白
- ③ 黒と白の2色

Q2 アビシニアコロブスの胃の数はいくつある？

- ① 1つ
- ② 3つ
- ③ 4つ

Q3 アビシニアコロブスの手の指の本数は？

- ① 3本
- ② 4本
- ③ 5本

Q4 アビシニアコロブスは他のオナガザルのように、ほお袋があるでしょうか？

- ① ある
- ② ない

Q5 アビシニアコロブスはアフリカの熱帯雨林、湿地林、川辺林、山地林、疎開林など多様な森林地帯に生息していますが、生息数はどうなっているでしょう？

- ① 減っている
- ② 変わらない
- ③ 増えている

A1	A2	A3	A4	A5